

Ponction veineuse

3 systèmes

- Vacutainer
- Monovette
- Butterfly

Contres indications absolues

- Fistule ArtérioVeineuse
- Plâtre, implant
- Curage ganglionnaire axillaire, lymphœdème
- Infection, phlébite
- Cicatrice

Contres indications relatives

- Paralysie, hémiplegie
- Amputation
- Perf. sur bras → stop 5 min
- Problème cutané
- Brulure ancienne

Complications

- Veine gonfle → Stop ponction, enlever aiguille → comprimer. Risque hématôme
- Veine peu visible → chaleur, déclivité, pomper avec la main
- Veine roule → tendre la peau ou abord latéral
- Piquage mais pas de sang → avancer de qqes millimètres, le Vacutainer enchâssé dans son support ou changer l'inclinaison de l'aiguille (biseau contre la paroi)
- Malaise vagal → allonger le patient, surélever les jambes
- Piqure accidentelle du soignant → laver au savon, désinfecter puis annoncer l'accident
- Douleurs au point de ponction → stop ponction
- Infection → prévention par la désinfection et respect du temps d'action (30 secondes min)
- Point de ponction ressaigne → comprimer

Ordre des tubes VACUTAINER

- Brun = sang natif
- Bleu = Coag
- Vert = chimie
- Violet = hémato.
- Mélanger en douceur les tubes
- Respecter le volume

Trucs

- Tapoter, NON perturbe le dosage de K
- Pomper
- Coussin chauffant ou lavette chaude
- Garrots avec manchette de pression, gonfler avec 20 à 30 mmHg

Ordre des tubes MONOVETTE

- Blanc = sang natif
- Vert = Coagulation
- Brun et orange = Chimie
- Rouge = Hématologie
- Jaune = Glucose