

	SC	IM
Angle de ponction	45° ou 90°	90°
Aiguilles	orange 25 G ou violette 24 G	jaune 20 G longue ou courte, verte 21 G, noire 22G
Pli cutané	Oui, relacher durant injection sauf pour les anticoagulants et l'insuline	Non, tendre la peau
Aspiration /Reflux	Oui pour tous sauf Anticoagulant et Insuline	Oui
Délai d'action	20 à 30 min	15 à 20 min
Localisations	Bras: face externe, Cuisse, face supéro externe, ventre: 2 à 5 cm coté G, D et inf de l'ombilic, Omopolate: base	Bras: Deltoïde, Cuisse: Quadriceps ou vaste externe, Fesse: Grand fessier
Contre indication	Lésion cutanée, Réaction allergique au produit, Fistule artérioveineuse	Lésion cutanée, Réaction allergique au produit, FAV, Paralysie du membre (CI relative) Patient sous anticoagulant (Sintron, Marcoumar, Xarelto), PTH, infarctus récent ou suspicion
Complications SC et IM	Infection, Hématome, Réaction allergique, Induration, Injection en IM au lieu de SC ou l'inverse, Lésion de l'os, Ponction d'un nerf, Ponction d'un vaisseau sanguin	
Médicaments	Insuline , Héparine, Clexane, Fragmine, Morphine	Vaccin, Vitamines B12, Atb, Neuroleptique (Risperdal, Haldol), hormones contraceptives